

Peta Lokasi



KLINIK SPESIALIS

Jadwal

Senin - Sabtu, Jam 07.00 wib - 21.00 wib

Informasi lebih lanjut

Hubungi Klinik Spesialis Rawat Jalan, Ground floor
ext. 1178 / 1179

COLUMBIA ASIA

HAEMORRHOID (WASIR)



Rumah Sakit Columbia Asia - Semarang
Jl. Siliwangi No. 143, Kode Pos 50145
Tel : +6224 762 9999 Fax : +6224 8646 2099
Layanan Gawat Darurat 24 Jam : +6224 762 7676
Jadwal dan Temu Janji : +6224 8646 2088
customer-care.semarang@columbiaasia.com

Rumah Sakit Columbia Asia - Semarang
www.columbiaasia.com



Apa itu Wasir?

Wasir atau Hemoroid adalah pembuluh darah yang membengkak didalam dan disekitar anus, serta bagian luar dubur. Kondisi seperti ini dapat terjadi pada siapa saja.

Wasir dapat dikategorikan menjadi dua macam, yaitu **wasir bagian luar** dan **wasir bagian dalam**. Namun demikian, para ahli bedah cenderung mengkategorikannya menjadi wasir stadium satu, dua, tiga dan empat.

◆ Wasir Stadium Satu

Pada stadium ini dubur mengeluarkan darah.

◆ Wasir Stadium Dua

Terjadi pembengkakan sehingga menimbulkan tonjolan yang keluar dari dubur. Namun tonjolan tersebut dapat masuk ke dalam dubur kembali jika terjadi kontraksi.

◆ Wasir Stadium Tiga

Tonjolan yang keluar dari dubur, hanya dapat dimasukkan kembali jika dibantu dengan jari.

◆ Wasir Stadium Empat

Tonjolan yang keluar dari dubur menjadi permanen dan tidak dapat dimasukkan kembali.

Apa yang menyebabkan Wasir?

Penyebab sebenarnya tidak diketahui. Namun, ada berbagai faktor penyebab terjadinya wasir, yaitu:

- Keturunan.
- Sembelit kronis.
- Usus besar tidak berfungsi baik dikarenakan penggunaan obat pencahar secara berlebihan atau terjadinya kram saat mengejan.
- Menghabiskan waktu yang lama pada saat buang air besar (misal: sambil membaca).
- Lanjut usia, sehingga tulang penopang menjadi lemah.

Apapun penyebabnya, jaringan penyangga pembuluh darah menjadi regang. Sebagai akibatnya, pembuluh darah menjadi besar, dindingnya menipis, meradang dan terjadi pendarahan. Bila peregangan dan tekanan terus menerus terjadi, pembuluh darah dan jaringan penyangga yang lemah akan menonjol keluar.

STADIUM 1 STADIUM 2 STADIUM 3 STADIUM 4



Apa gejala-gejalanya?

Bila anda memiliki gejala-gejala berikut ini, anda mungkin menderita wasir:

- Keluarnya darah segar pada saat mengejan, baik menetes, menyembur ataupun membekas pada tissue.
- Keluarnya tonjolan pada saat mengejan.
- Rasa sakit atau gatal disekitar daerah dubur.
- Menghabiskan waktu yang lama pada saat buang air besar (misal: sambil membaca).
- Timbul sebuah atau beberapa benjolan yg sensitif.


Bagaimana cara mengatasi wasir?

Gejala-gejala ringan dapat dihilangkan dengan banyak mengonsumsi makanan berserat dalam jumlah besar secara teratur (misal: sayuran, roti dan sereal) dan banyak minum air putih.

Menghilangkan tekanan pada perut yang berlebihan, dapat mengurangi tekanan pada wasir dan membantu mencegah terjadinya tonjolan. Kebiasaan membaca saat buang air besar harus dihilangkan agar pendarahan pada wasir berkurang.

Gejala dini pada wasir membutuhkan perawatan special seperti misalnya lglase, injeksi atau koagulasi sinar infra.

Macam-Macam Jenis Wasir




Operasi adalah metode terbaik untuk penyakit wasir stadium tiga atau empat. Operasi ini dilakukan dengan anestesi dan rawat inap.

Dengan teknik operasi terbaru, menggunakan HAL RAR System, akan mengurangi rasa sakit setelah operasi dan pada saat buang air besar.

Tindakan Operatif Menggunakan HAL & RAR System

1. Teknik operasi ini bekerja dengan menggunakan prinsip memindahkan wasir kembali ke posisi semula, dimana pada saat yang sama, mengikat aliran darah dengan menggunakan **HAL (Haemorrhoidal Artery Ligation)**, sehingga wasir menyusut dan mengecil. Pengikatan dilakukan sekitar 2-4 cm diatas batas "linea dentate" dimana tidak terdapat sensor syaraf. Maka, prosedur ini mengakibatkan berkurangnya rasa sakit yang terjadi setelah operasi dan maupun pada saat buang air besar.
2. **RAR (Recto Anal Repair)** mengobati wasir yang prolapse (stadium lanjut) dengan cara mucopexy.



Keuntungan dengan HAL & RAR System

1. Efektif terhadap 3 gejala utamanya yaitu perdarahan, nyeri dan gatal dengan HAL sedangkan pengobatan pada stadium lanjut dengan RAR
2. Teknik ini dikatakan ramah terhadap pasien karena minimal sakit dan pemulihan yang cepat
3. Aman karena lebih sedikit komplikasi paska operasi, tidak merasakan nyeri dan dapat langsung beraktifitas seperti biasanya.

